



NIEUWSBRIEF

MEI 2021

Beste leden,

De kascommissie heeft de financiële stukken en bankzaken gecontroleerd en goedgekeurd, en hierop decharge verleend aan het bestuur voor 2020

Verder hebben we besloten om weer een ééndagskeuring voor Kanaries, Tropen, en Kromsnavel te gaan houden, deze dag wordt gehouden op zaterdag 25 september 2021. Hoe gaat dit:

Hallo beste kleurkanariëkwaker en Postuurkanariëkwaker, Tropenkwaker en Kromsnavelkwaker

Op 25 september 2021 willen wij van v.v. Haarlemmermeer, de 1^e nationale Kleur en Postuur kanarie, tropen en kromsnavel dag organiseren.

Wat houdt een dergelijke keuring in:



Dat u als inzender maar 1 dag met de vogels van huis bent, en dat dit voor de vogels vrijwel geen belasting met zich meebrengt.

U kunt als inzender de keuring volgen, u krijgt geen keurbrief, maar een uitleg over de vogel door de keurmeester, die de vogels gaat keuren volgens een plaatsingsstelsel, waar uiteindelijk 7 vogels worden geplaatst per hoofdgroep.

Ook is er de mogelijkheid om met de keurmeester in discussie te gaan als u vragen hebt over de beslissing van hem, zolang u hem maar niet gaat beïnvloeden in zijn keuzes.

Na de keuring zijn de keurmeesters nog aanwezig in de zaal zodat u ze dan nog vragen kunt stellen, specifiek over uw vogels bijvoorbeeld.

Het doel is dat u een leerzame dag heeft, gezellig ervaringen kunt wisselen met elkaar, en ook nog een beetje competitie onder elkaar heeft.

Wanneer gaat deze dag plaats vinden en waar wordt deze gehouden?

Deze dag wordt gehouden op zaterdag **25 september 2021** in het:

Clubhuis van v.v. Haarlemmermeer te Zwanenburg
Marialaan 86
1161 XD Zwanenburg
TEL; 06 34 500080

De vogels worden gekeurd door internationaal bekende keurmeesters:

De dagindeling zal er als volgt uit gaan zien:



- inbreng vogels tussen 8.00 en 9.00 uur *(met koffie en cake)*
- start keuring rond 9.30 uur
- einde keuring rond 12.30 uur
- show open vanaf 13.00 tot 15.30 uur
- sluiting met prijsuitreiking 15.30 uur
- uitgifte vogels rond 16.00 uur

Voor vragen of een uitleg over deze dag kunt u contact opnemen met:

Bert Moleman 06 34 500080

Email bert@mebe.nl

Downloaden vraagprogramma www.vogelvereniging.nl

Reglement Kleur en Postuur kanarie, Tropen en Kromsnavekdag Haarlemmermeer 2021

1. De inschrijving is opengesteld voor alle liefhebbers die ingeschreven zijn bij een door de C.O.M. erkende organisatie. Alleen enkelingen zijn toegelaten dat volgens het geldende N.B.v.V. vraagprogramma (zie tt-katern of www.nbv.nl)
2. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,00 per vogel, te betalen bij het inbrengen. De inschrijfgelden worden vrijwel totaal aan klassementsprijzen besteed. Catalogus € 2,50.
3. Kooinummern worden naar de inzenders gezonden. Inbrengen in **eigen kooien**, nieuwe waterflesjes worden ter beschikking gesteld door de organisatie.
4. Wel ingeschreven maar niet ingebrachte vogels levert geen vermindering van het inschrijfgeld op,



5. Zieke vogels en/of vuile kooien worden geweigerd. Voor ziekte of dood tijdens of na de show is de organisatie niet aansprakelijk.
6. Dagindeling;
 - Inbrengen van de vogels op zaterdag 25 september van 08.00 uur tot 09.00 uur in Clubgebouw Haarlemmermeer, Marialaan 86, 1161 XD Zwanenburg
 - Start keuring rond 09.30 uur, einde keuring rond 12.30 uur
 - Show open van 13.00 uur tot 15.00 uur
 - Sluiting met prijsuitreiking 15.30 uur
 - Uitkooien van vogels na de prijsuitreiking om circa 16.00 uur
7. Ingeschreven kan worden in hoofdgroepen 6 t/m 24, alleen A-vogels. Hoofdgroep 25 is uitgesloten van deelname, en de hoofdgroepen 26 t/m 31. Inschrijving sluit op vrijdag 17 september 2021.
8. Prijsverdeling;
 - Per hoofdgroep is er een plaatsing van 1 tot 7 volgens het Engelse keursysteem. De vogel op de 1^e plaats krijgt 7 predicaatpunten, de 2^e krijgt 6, de 3^e krijgt 5 enzovoort. Iedere geplaatste vogel krijgt een prijskaart op de kooi.
 - Uit de 3 lipochroomreeksen zal de “kampioen lipochroom” worden gekozen.
 - Uit de 4 klassieke melaninereksen zal de “kampioen klassieke melanine” worden gekozen.
 - Uit de 5 reeksen pastel, grijsvleugel, opaal, phaeo en satinet zal de “kampioen oude mutaties” worden gekozen.
 - Uit de 7 reeksen topaas, eumo, onyx, kobalt, jaspis, combinatie van factoren en niet erkende kleuren, zal de “kampioen nieuwe mutaties” worden gekozen.
 - Uit de reeksen frise, en houding rassen zal een kampioen worden gekozen.
 - Uit de reeks vormrassen zal ook een kampioen worden gekozen.
 - Uit de reeks ongekuifde en gekuifde rassen zal ook een kampioen worden gekozen.
 - Uit de reeksen duitsekuif en getekende rassen zal ook een kampioen worden gekozen.
 - De tropische vogels worden ondergebracht in 9 groepen, zebrevink, Japanse meeuwen, Spitsstaarten, Zilverbekken, Loodbekjes, Rijstvogels, Goldamadines, Alle overige tropen, en Europese cultuurvogels.
 - De Kromsnavelen worden ondergebracht in 9 groepen, Hollandse grasparkiet, Engelse grasparkiet, Agapornis fischeri, Agapornis roseicollis, Prachtrossella's, Turquoise parkiet, Adelaïderossella, Australische koningsparkiet, Halsbandparkiet, Grote Alexanderparkiet.
 - Deze kampioenen zullen worden gehonoreerd met een rozet op de kooi plus 10 predicaatpunten.
 - Uit de 4 kampioenen van zowel de kleur als postuurkanaries, de tropen, en de kromsnavelen zal de “**Beste kleurkanarie** en de **Beste postuurkanarie** en de **Beste**



Tropischevogel, en de **Beste Kromsnavel** van de Show” worden gekozen die 15 predicaatpunten verdient, 2^e 11, 3^e 7, 4^e 3 punten

- Van de 5 hoogst gewaardeerde vogels van iedere inzender zal een klassement worden opgemaakt. De inzender met de meeste predicaatpunten komt op plaats 1 van het klassement enzovoort. Iedere inzender zal met een klassementsprijs worden vereerd.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Het vraagprogramma volgt nog.

Vanzelfsprekend rekenen we op uw deelname!

Verder hebben we dan 5 weken later de Tentoonstelling 2021. Deze show wordt gehouden in week 44 van 5 november tot 7 november 2021

Wat de beurs betreft, deze gaat ook in Juni, Juli, en Augustus door conform de Covid-19 regels.

DE ROODVOORHOOFD KANARIE



Wat voor vogel is dit, het is in mijn ogen geen kanarie:

Serinus pusillus

Geografische verspreiding en biotoop

De Roodvoorhoofd cini (*Serinus pusillus*) heeft zijn leefgebied van het Midden-Oosten tot ver in Azië, vanaf Turkije tot Iran, Pakistan, Afghanistan, India, China, Tibet en Nepal. Het is een *Serinus* soort die kiest voor bergachtige streken. 's Winters worden de valleien opgezocht, 's zomers zoeken de Roodvoorhoofd kanaries het hogerop. Ze zijn goed tegen kou bestand. Opmerkelijk is dat er soms ook trekbewegingen zijn waarbij de vogels komen tot Libanon, Egypte, Irak, Syrië en Israël. Deze vogels zoeken voedsel op open, rotsachtige terreinen. Ze worden ook etend van boomzaden als berken en elzen gezien, evenals van meer laag aan de grond groeiende voedselplanten als distels, raket, vogelmuur en andere kruiden. Het



biotoop is sterk variërend; gebergte begroeid met dennen tot hellingen met jeneverbessen. Over de plaats van het nest, de nestmaterialen en de periode van nestelen wisselen, om begrijpelijke redenen, de observaties per verspreidingsgebied. Tijdens het baltsen waarbij enthousiast het lied wordt voorgedragen, laten de mannetjes de vleugels hangen en worden de kopveren wat opgezet zodat het rode voorhoofd nog meer opvalt. De Roodvoorhoofd kanarie behoort tot de Europese vogelsoorten en valt onder de wettelijke regelingen voor Europese vogels. Ringmaat in NL 2,5 mm met breukzone.

Grootte 12 cm.

Geslachtsonderscheid en ondersoorten

Er is verschil tussen zomerkleed en winterkleed. Ofschoon er geen melding is van ondersoorten bij *Serinus pusillus* blijkt uit de beschikbare foto's dat er veel verschillen in kleur(diepte) en tekening zijn. Op het eerste oog is het uiterlijk geslachtsverschil moeilijk. Er zijn kleine aanwijzingen. Man en pop in voortplantingsconditie tonen een helder rood voorhoofd. In optimale verenpracht is het zwart op de kop en borst bij het mannetje dieper en daardoor in fel contrast met het rode voorhoofd. De diepte van de zwarte en de rode kleur zijn bij de pop net iets minder. Goed op kleur zijnde mannen hebben een oranjegele stuit. Er wordt gemeld dat mannetjes op het rugdek meer zwart tonen en dat ze een meer uitgesproken roodbruine schoudervlek hebben. Jonge vogels hebben geen rood voorhoofd en de kopkleur is bruinzwart. De intensiteit van de rode kopkleur kan bij vogels in volières verminderen. DNA onderzoek op enkele veren kan uitsluitsel geven over het geslacht van jonge, in de avicultuur geboren vogels die nog niet op volle kleur zijn. Verwisseling met andere *Serinus* soorten is uitgesloten. Nauw verwantschap met de Syrische cini (*Serinus syriacus*) ligt voor de hand.

Bijzonderheden

Serinus pusillus is een vogel die vanwege het rode voorhoofd tot de verbeelding spreekt. Niet altijd en overal is het houden en kweken van Roodvoorhoofd cini's een succes. Er moet speciale aandacht worden geschonken aan hygiëne en voorkoming van ziektes. Tot op heden is er geen duidelijkheid waarom Roodvoorhoofd kanaries na enkele maanden goede conditie plotseling verzwakken. Extra toediening van vitamine K wordt door sommige kwekers gepropageerd. Soms blijkt het zeer lastig deze vogels in kweekconditie te brengen; een enkele keer worden onverwacht goede resultaten geboekt. Misschien is het een goede overweging door een (vogel)dierenarts met regelmaat mestonderzoek te laten doen. In het zaadmengsel willen deze vogels raapzaad. Deze *Serinus* soort houdt er, naar verluidt, een aparte eigenschap op na. Het komt voor dat na het leggen van het eerste legsel, de



man alleen, een tweede nest bouwt terwijl de pop het eerste nest uitbroedt. Zodra de jongen geboren zijn, legt de pop direct een legsel in dat tweede nest. En terwijl de pop vervolgens ook het tweede nest uitbroedt, neemt de man de zorg voor de jongen in het eerste nest op zich. Hierdoor wordt de kans vergroot op voldoende nakomelingen in hun natuurlijke habitat, waar maar een korte tijd van overvloedig aanbod van voedsel is waarmee de jongen gevoerd kunnen worden. De fout wordt wel eens gemaakt, dat de kweker dit gedrag verkeerd beoordeelt en de man uit de broedkooi of vlucht verwijderd. Aangeraden wordt dan ook om meerdere nestgelegenheden ter beschikking te stellen om aan dit gedrag tegemoet te komen en niet in te grijpen door de man te verwijderen.

 